

Familie/Nabestaanden

Woonplaats, datum

Analyse n.a.v. medisch dossier  
Cardioloog / BIG nr.

Geachte heer / mevrouw

**Betreft: Analyse n.a.v. medische dossier patiënt in verband en linkerhartfalen  
werking Nifedipine Perindopril**

Nifedipine wordt niet gebruikt in hartfalen, wel voor hypertensie. oedemen zijn een klassieke nevenwerking van alle calcium-blokkers (zoal Nifedipine). Perindopril is even goed als Captopril aangewezen bij hartfalen. Perindopril werkt langer (24 uur) dan captopril (8 uur) en is dus handiger te gebruiken. Hun effect op de nierfunctie is vergelijkbaar (intrinsiek nierbeschermend, bloedwaarden van nierfunctie kunnen paradoxaal genoeg wat verslechteren).

**N.a.v. rapportages ziekenhuizen**

Belangrijke kanttekening is echter dat, indien uw moeder haar hartfunctie niet normaal zou geweest zijn (hiermee wordt bedoeld de systolische LV functie, aangeduid door "ejectiefractie"), de keuze van specifieke medicijnen ter behandeling wel van groter belang zou zijn. Dit valt enkel te bepalen aan de hand van een echocardiogram (of hartkatheterisatie, MRI of isotopenscan), die de laatste zeven jaar nooit gebeurd is.

De echocardiografie is voor de cardioloog de hoeksteen van de diagnose en opvolging van de patiënt met hartfalen. Ik kan dan ook niet begrijpen waarom op geen enkel ogenblik tussen 2008 en eind 2015 door haar behandelend cardioloog een echocardiogram gepland (laat staan verricht) werd, zeker nadat toch verschillende elementen in haar cardiale toestand wijzigden (pacemaker in 2008, atriumfibrilleren in 2014, hartdecompensatie in 2015, nadien nog vermoeden NSTEMI).

Hoogachtend,